

**SITUACE V ČR:**

Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od 1.9.2015 do 29.1.2016: v ČR bylo v uvedeném období hlášeno celkem 33 klinicky závažných případů chřipky, z nichž ve 4 případech došlo k úmrtí. Počet úmrtí tedy v porovnání s předchozím KT zůstává nezměněn, ale narostl počet evidovaných těžkých průběhů. Jako etiologické agens byl ve 3 případech prokázán virus chřipky typu B, v 10 případech se jednalo o virus chřipky A, v 17 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2 a v jednom případě se jednalo o duální infekci s průkazem viru chřipky typu B a A/H1N1. U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a vesměs nebyli očkováni proti chřipce popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 35 let – 82 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo ve 12 případech o ženy a ve 21 případech o muže. V 22 případech byla podána antivirotika. ([zdroj: mzcr.cz](http://mzcr.cz))

NRL pro chřipku eviduje během 3. a 4. KT 2016 nárůst indikací k vyšetření respiračních virů stejně jako nárůst pozitivních průkazů chřipky, především subtypu A/H1N1. Nicméně, byla opakovaně zachycena i chřipka typu B a chřipky subtypu A/H3N2. Počínající epidemii tedy způsobuje chřipka subtypu A/H1N1, typ B a subtyp A/H3N2 zatím ko-cirkulují spíše minoritně.

Nemocnost podle očekávání dále stoupá, a to jak v kategorii „ARI“, tak i v kategorii „ILI“. ARI celorepublikově stoupl o 10,58% (celková nemocnost dosáhla 1 317 případů na 100 000 obyvatel), nejvíce pak ve Zlínském Kraji (o 21,85%). ILI celorepublikově stoupl o 67,35%, nejvíce pak v Libereckém kraji, Pardubickém a Zlínském kraji stejně jako v Praze a ve Středočeském kraji (ve všech těchto lokalitách nárůst přesahuje 100%).

**K 29.1.2016 tedy byla situace hodnocena jako rozvíjející se chřipková epidemie, zatím spíše lokálního charakteru. Dominujícím kmenem je subtyp A/H1N1, typ B a subtyp A/H3N2 ko-cirkulují. Dosud otypované kmeny vykazují antigenní shodu s vakcinálními prototypy.**

**SITUACE V EVROPĚ:**

Plošná epidemie přetrvává v celé severní Evropě. Střední Evropa je spíše ve fázi rozvíjejících se epidemií, v Německu konkrétně jsou hlášeny epidemie regionální, na Slovensku a v Polsku se jedná stále spíše o sporadický až lokální výskyt. Rakousko své údaje doposud nehlásilo. Dominujícím kmenem je subtyp A/H1N1. Těžké případy chřipky jsou hlášeny především z věkové kategorie 15-64 let, ve zvýšené míře stále ze zemí Blízkého východu (Arménie, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina)

zdroj: [www.flunewseurope.org](http://www.flunewseurope.org)

MUDr. Martina Havlíčková, CSc., NRL pro chřipku a nechřipkovou virovou respirační onemocnění