

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry

1.12.2008

Situace v ČR:

Stále je klidná. Hodnota celkové relativní nemocnosti ARI byla ve 48.KT v ČR 1219 případů na 100 000 obyvatelstva (vzestup o 9,3% oproti předchozímu KT), což odpovídá předpokládanému výskytu v tomto ročním období.

Je optimální doba pro vakcinaci proti chřipce, na niž je důležité pacienty průběžně upozorňovat!

Situace v Evropě:

Chřipková aktivita byla ve 47.KT nízká ve všech 27 zemích poskytujících svá data do databáze EISS/ECDC. Sporadický výskyt chřipky hlásilo 9 zemí (Belgie, Dánsko, Anglie, Irsko, Severní Irsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko).

Během 47. KT bylo do databáze EISS/ECDC nahlášeno celkem 435 vyšetřených sentinelových výtěrů, z nichž bylo 40 (9,2%) chřipka pozitivní. Z tohoto počtu byla 38x zachycena chřipka typu A (z toho 32xH3, 6x netypováno) a pouze 2x prokázána chřipka typu B. Z nesentinelových zdrojů zachyceno celkem 35 případů chřipkové infekce, z toho 34x typ A (1xH1, 8x H3, 25x netypováno) a 1x typ B.

Od 40.KT až dosud byl virus chřipky detekován v 19 zemích. V naprostá většině případů (91%) byla prokázána chřipka typu A, z toho 86% činil subtyp H3. Nicméně, stále ještě je brzy na rozhodnutí, který typ nebo subtyp viru bude v Evropě v této sezóně dominovat.

Zatímco aktivita chřipky je v Evropě zatím nízká, zvyšují se počty detekcí RSV v některých zemích (Anglie, Irsko, Severní Irsko, Nizozemí), což odpovídá podzimnímu období.

RNDr.M.Otavová

NRL pro chřipku