

**Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry
13.12.2010**

Situace v Evropě a v ČR (ECDC 10.12.2010):

Laboratorní průkazy charakterizující incidenci chřipky začínají stoupat, a to v řadě států. Celkem 15 evropských států hlásí sporadický výskyt, ale 2 již hlásí lokální epidemie (Norsko a Anglie). Oproti 47. KT je v evropských hlášeních 10% nárůst chřipky především v sentinelové síti. Belgie, Finsko a Anglie hlásí nárůst průkazů v rozmezí od 19% do 31%. Chřipka A (s převahou pandemického kmene) byla prokázána v 60% vyšetření, chřipka B ve 40%. Z tohoto poměru je patrné, že etiologie chřipkových infekcí v letošní sezóně může být velmi různorodá. V Belgii, Itálii, Norsku, Portugalsku a Anglii je dokonce chřipka B typu dominujícím kmenem.

V ČR nemocnost mírně stoupá, ale zvýšený výskyt chřipky sentinelová vyšetření zatím nenaznačují. Naopak stále jsou prokazovány jiné než chřipkové respirační viry, především RSV. Nicméně trend v Evropě je jasný a je otázkou krátké doby, kdy bude patrný i v ČR. Prosíme všechny spolupracující lékaře i laboratoře o maximálně intenzivní surveillance, a děkujeme za dosavadní výbornou spolupráci. Rovněž je vhodné, aby se urychlilo očkování proti chřipce, nástup epidemie může nastat již v prvních lednových týdnech.

MUDr. Martina Havlíčková, CSc