

Situace v Evropě: je, stejně jako v minulém KT, stále klidná, občasné záchyty obou subtypů chřipky typu A i chřipky B (spíše linie Yamagata). Záchytnost chřipky v sentinelových materiálech se v Evropě zvýšila na 4,5%, což však stále odpovídá roční době i hodnotám zaznamenaným během minulých let. Dosud publikované laboratorní výsledky nejen v Evropě, ale i v USA naznačují, že by dominujícím kmenem letošní sezóny mohl být opět subtyp A/H3N2 v kocirkulaci s chřipkou B/Yamagata. Nicméně na přesnou predikci je stále velmi brzy a tyto údaje je nutné hodnotit jako předběžné.

Situace v ČR: ve virologické surveillanci stále převažují rhinoviry, což je pro danou roční dobu typické. Z celkem vyšetřených 83 sentinelových pacientů byly rhinoviry diagnostikovány u 29 osob (34,93 %), s dalšími nechřipkovými respiračními viry byla diagnóza určena u 36 osob (**záchytnost celkem tedy 43,37 %**). U rhinovirů je v tuto chvíli zajímavý jejich výskyt napříč celým věkovým spektrem bez výraznější dominance.

Stále lze očkovat proti chřipce.

M.Havlíčková

NRL pro chřipku