

- nenásilně neutralizovat škodlivé látky, které s každou potravou přijmáme a které není většinou možné nějak přímo prokázat.
- Z důvodů nadbytečného dráždění žaludu k vyšší produkci kyseliny nekonzumujte velké množství kyselých nebo nakládaných ryb a zeleniny (např. čalamády). Pokrmy dochucujte přednostně nedráždivým kořením a zelenými natěmi. Hodně se hovoří o geneticky upravených potravinách. Zdá se, že nebudou významně negativně ovlivňovat dosavadní reakci organismu, ale konečné slovo ještě s určitostí nebylo řečeno.
- Žádná speciální dietní léčba, která by zabránila vzniku vředu, neexistuje.

- Pravidelně užívání léků proti bolestem hlavy a kloubů se může podílet na vzniku vředu. Poradte se proto o nutnosti, častosti a typu zvoleného léku vždy s ošetřujícím lékařem. Při jejich užívání a při současném vzniku zažívacích obtíží vždy na tuto skutečnost upozorněte ošetřujícího lékaře, který provede úpravu dávkování nebo přídá lék šetrící žaludek. Zvlášť důrazně tohoto lékaře upozorněte na situaci, kdy jste již v minulosti vředovým onemocněním trpěli.
- Požívání kávy a alkoholických nápojů je nevhodné především ve spojení s kouřením, bez současného jídla, v nadměrné míře a příliš často. V období obtíží jsou zcela nevhodné.

Na závěr uvádíme několik vhodných předpisů pro onemocnění s vředovou chorobou:

Zapeklané brambory s brokolicí 1 porce

50 g vařených brambor	15 g řepkového oleje
100 g brokolice	sůl, muškatový oršek
30 g Eidamu 30%	

Uvařené brambory nakrájíme na plátky, promicháme s uvařenou brokolicí a kořením. Směs vložíme do vymaštěné zapékací misky, posypeme strouhaným syrem a zapečeeme.

Nákyp z rybího filé 1 porce

100 g rybího filé	1 lž. strouhanký
15 g másla	1/2 ks vejce
5 g hladké mouky	trochu mléka, sůl

Z mouky a másla připravíme světlou jišku, zředíme ji mlékem, rozmixháme a povaříme. Rybí filé podusíme v horčíku domáckou, poté drobně nakrájíme a vložíme do povařeného záludu, přídáme žloutek, sůl, nakonec lehce vymixháme ušlehaný směs z bílků. Směsi naplníme vymaštěnou a strouhanou vysypanou formu a v předeřehádaté troubě pečeme.

Hovězí po zahradnicku 1 porce

120 g hovězího masa	10 g celery
20 g mrkví	10 g másna
10 g petržely	sůl, drcený kmín

Omyté maso na sucho oprážíme, podlijeme, osolíme, pokrmíme a dusíme. 3/4 hodiny před dokončením přidáme očistěnou nastrouhanou zeleninu. Na závěr přidáme máslo.

Rýžový salát 1 porce

150 g vařené rýže	35 g tunáka ve vlastní šťávě
20 g mrkví	1/2 ks vejce
20 g kukuřice	

Do uvařené rýže přidáme sterilovanou mrkev, kukurici, tunáka a natvrdo uvařené vejce. Vše pojďme promícháme, můžeme servírovat i studené.

Telecí po italsku 1 porce

100 g telecího masa	10 g rajského protlaku
10 g hladké mouky	sůl

Nakrájené maso na kostky nasucho opečeme, osolíme, podlijeme vodou nebo vývarom a dusíme doměkká, krátkce před dokončením zahustíme zálivkou připravenou z vody a mouky, dochutíme rajským protlakem.

Autor:



Recenze:
Doc. MUDr. Milán Kmínt, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Prozazík, CSc.
Ludek Rohlik
Grafická úprava:
Mgr. Dana Fragnerová
Odpovědná redaktorka:
Státní zdravotní ústav, Sroboňova 48, Praha 10
Vydáno:
GEOPRINT, Krajinská 1110, Liberec
Realizováno:
1. vydání, Praha 2003
© Státní zdravotní ústav
NEPRODEJNÉ

Onemocnění peptickým vředem je onemocněním v zásadě chronickým, to známená, že vřed se pravidelně vyskytuje a zase mizí, a to většinou na stejných místech (at už v žaludku či

Díeta při vředové chorobě

Jako vředy žaludku a dvanáctníku, lépe peptické vředy, nebo též vředová choroba gastroduodenální se označují onemocnění, při nichž se v oblasti trávicího ústrojí vyměšujího kyselinu solnou a pepsin (proto peptické vředy), tedy obvykle defekty ve sliznici.

V 80. letech minulého století byl učinen půlomový objev ohledně vzniku peptických vředů. Australští badatelé našli v žaludku bakterii, která byla později nazvána Helicobacter pylori a která se nacházela u většiny osob se žaludečními a především dvanáctníkovými vředy. Pokus o antibiotickou léčbu tohoto mikroba vedl k úspěchu. Bakterie vymizela, vřed se vyholil a později se již neopakoval. Proto se tento postup stal součástí běžné léčby. V současné době je důležitá i další příčina vzniku vředů, zvláště žaludku. Souvisí s častějším užíváním protibolestivých léků, jako je acetylprometazin, nebo novějších tzv. nesteroidních antirevmatik, jako je ibuprofen, a dalších.

Onemocnění peptickým vředem je onemocněním v zásadě chronickým, to známená, že vřed se pravidelně vyskytuje a zase mizí, a to většinou na stejných místech (at už v žaludku či

dvanáctníkovém bulbu) a opakuje se opět v určitém obdobu. Tou bývá většinou jaro a podzim, ale tento rozdíl se v posledních letech poněkud stírá. Vřed se objeví, po léčbě vymizí a pak se po čase může, ale nemusí opakovat znova. Stravovacím zvyklostem se dnes nepřikládá takový význam, jako tomu bylo dříve. Nepravidelná životospráva, spočívající především v celodenním hladovění a přejedením se po skončení pracovního procesu večer, bývá většinou důsledkem nepřiměřeně vysokých nároků na organismus, které v nynější době pocítujeme zvláště intenzivně. Je třeba splnit během dne řadu úkolů, z nichž některé jsme dříve nejen neznali, ani si je nedovedli představit. To všechno potřebuje čas, kterého je stále stejně množství, pouze počet nutných výkonů se znásobil. Bohužel vše nelze stačit najednou, život přestává mit svůj řad a hierarchie a následná posloupnost důležitých či méně důležitých činností se narušuje, čímž trpí celý organismus, jehož porucha se pak projeví na některých orgánech.

V současné době se kladé důraz na tzv. racionální stravu s využitím obsahem živin jak při léčbě všech chorob, tak i v doporučených normální stravě u zdravých osob. V tomto ohledu nám může být vzorem kuchyně z oblasti Středozemního moře, tzv. mediteránní strava, obsahující olivový olej, ryby, netučná masa, zeleninové saláty a ovsem červené víno. V jeho případě se hovoří o tzv. francouzském paradoxu, který prokázal v červeném vínu antioxidanty, tedy látky neutralizující odpadové produkty metabolismu. Francouzi jsou zemí s nízkým výskytem infarktu myokardu a tato skutečnost je odůvodňována i pravidelným mírným příslunem červeného vína a začíná mít ohlas i ve vědeckém světě.

Ukázněnost pacienta, změna životního stylu a stravovacích zvyklostí a jejich vliv na vznik a lečení vředu žaludku a dvanáctníku jsou důležitými faktory, které mají podpůrný vliv na celý organismus a chrání i před dalšími nemocemi. Důležité je vědět, čeho by se měl nemocný s vředovými obtížemi vyvarovat.

Nejobávanější škodlivinou je kouření.

Kuřáci mají zvyšené riziko vzniku vředu, a to v závislosti na množství vykouřených cigaret. Kouření dále zpomaluje hojení vředu a vliv na jeho recidivu, tedy jeho znovuobjevení. Vředová choroba je totíž chronickým onemocněním, kde se vřed periodicky opakuje a zase mizí, a to i bez ohledu na to, že někdy pacient potíže má a jindy nikoliv. Ten fakt byl potvrzen studiem, které vyšetřovaly nemocné pravidelně i bez objevení příznaků a vřed byl přesto nalezen. Také riziko komplikací vředu, jako je krvácení (u laiků označováno jako prasknutí) nebo perforace, je u kuřáků vyšší.

Za další nevhodnou pochutinu pří-

jakékoliv nemoci, zvláště pak vředové nemoci, je považována káva. U ní vadi nejen obsah kofeinu (podobná látka je však i v čaji), zvyšující kyselou žaludeční sekreci, ale i produkty pražení kávy. **Její zákaz neplatí absolutně**, jde především o to, aby nebyla konzumována často, na kažný žaludek, příliš koncentrovaná (doporučujeme doplnit mlékem či smetanou) a také požívána v souvislosti s oblibenou cigaretou.

Koncentrovany alkohol ve formě destilátu je rozhodně u vředové choroby nevhodný. 40% lihový roztok, který je hlavní součástí těchto tekutin, přímo žaludek dráždí, jak můžeme vidět při pozorování žaludeční sliznice

píjáků, která je trvale překvarena. Alkohol dráždí totíž nejen k většímu produkci žaludeční kyseliny, ale přímo poškozuje žaludeční sliznici. Konzumenti koncentrovaných lihovin dobře znají pocit sevření v krku a na hrudníku při podráždění jícnu procházejícím alkoholem.

Pokud trpíte vředovou chorobou, nebo jste již ataku vředového onemocnění prodělali, nebo se ve vaši rodině onemocnění vředovou chorobu či pouze zažívající potíže vykystovaly, pak by bylo vhodné se zamyslet nad několika uvedenými radami:

- Přestaňte s kouřením nebo jej alespoň omezte. Musíte mít pro své rozhodnutí motivaci. Pokud ji nemáte nebo si ji nevytvorte, pak je naděje na úspěšné splnění tohoto úkolu malá. Kouření je nebezpečné nejen pro vřed, ale především pro srdeční tepny, jejichž postižení urychlenu aterosklerózou způsobuje srdeční infarkt, ischemickou chorobu dolních končetin, dále rakovinu plic, rakovinu slinivky a řadu dalších nemocí.
- Pravidelné časování stravování zamezuje nepravidelnostem ve vyplavování nejen kyselinou solnou, ale i trávících působků, ovlivňujících trávení a vstřebávání přijatých živin. Pokrmy a nápoje konzumujte v přiměřené teplotě.
- Dávejte přednost racionálně složené a vyvážené stravě s omezením tuků, jako jsou hrámkový, tatarská omáčka. Na jídleníček zařazujte libová masa, nízkotučné mléko a mléčně výrobky. Pro vysoký obsah skrytých tuků se vyhýbejte uzeninám (trvanlivé salámy, klobásy), šlehačce, smetanovým jogurtům a příliš tučným sýrem.