

Vakcinace v případě nedoložení dokladů o předchozí vakcinaci podle doporučení ECDC

Onemocnění	Děti a dospívající (<18 years)	Dospělí(> 18 years)
Prioritní vakcinace		
covid-19	Nabídnout základní vakcinaci mRNA vakcínou dětem a dospívajícím v souladu s doporučeními v hostitelské zemi (Comirnaty u ≥5 let věku a Spikevax ≥6 let věku jsou schváleny v EU/EEA)[30]. Nabídnout booster dávku adolescentům ≥12 let věku v souladu s doporučeními v hostitelské zemi (pouze Comirnaty schválena v EU/EEA) [31,32].	Nabídnout základní vakcinaci a booster dávku (dávky) všem dospělým v souladu s doporučeními v hostitelské zemi. Použití jednodávkové základní vakcinace (např. Janssen COVID-19 vaccine) lze zvážit, zvláště je-li aplikace druhé dávky jako doplnění primární vakcinace problematická.
spalničky, příušnice, zarděnky (MMR)	Nabídnout MMR jedincům ≥9 měsíců věku. Dvě dávky MMR by měly být aplikovány nejméně s měsíčním odstupem*, ale vhodněji s odstupem delším, v souladu s doporučeními v hostitelské zemi. Očkování proti spalničkám před uplynutím 12 měsíců věku nevyvolává protekci u všech očkovaných a je třeba je zopakovat znovu po ukončení 12 měsíců věku.	Nabídnout buď jednu dávku nebo v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.*
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae b (+ VHB)	Nabídnout jedincům ≥2 měsíců věku, tři dávky DTaP-IPV-Hib (Hib komponenta pouze dětem <6 let věku pokud nejsou jiná specifická doporučení v zemi) nejméně v měsíčním interval a následně booster dávku v souladu s doporučeními v hostitelské zemi. Pentavalentní a hexavalentní kombinované vakcíny jsou schváleny do šesti let věku.	Nabídnout všem dospělým primární vakcinaci proti záškrtu, tetanu a poliomyelitidě nebo v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.
Zvážit		
virová hepatitida B, VHB	Nabídnout jedincům ≥2 měsíce věku, tři dávky v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.** Nabídnout novorozencům HBsAg-positivních matek během 24 hodin po narození, v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.	Nabídnout všem dospělým (s/bez předchozího skrínigového vyšetření) v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.

Meningokoková onemocnění	Použít doporučení hostitelské země pro meningokokové vakcíny proti séro skupinám A, B, C, W135 a Y, s ohledem na epidemiologickou situaci.	
Pneumokoková onemocnění	Nabídnout jedincům ≥2 měsíců věku 1–3 dávky konjugované vakcíny nejméně v intervalu jednoho měsíce, v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.	Nabídnout jedincům ≥ 65 let, v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.
plané neštovice Varicella*	Doporučení v hostitelské zemi by mělo být dodrženo bez ohledu na epidemiologickou situaci. Dvě dávky vakcíny jedincům ≥11 měsíců věku, nejméně v intervalu jednoho měsíce, pokud možno v intervalu delším.	Doporučení v hostitelské zemi by mělo být dodrženo s ohledem na epidemiologickou situaci. Zvážit vakcinaci neimunních netěhotných žen ve fertilním věku.
Chřipka	Doporučení v hostitelské zemi by mělo být dodrženo bez ohledu na epidemiologickou situaci. Žádoucí je vakcinace rizikových skupin starších šesti měsíců před a během chřipkové sezóny	Doporučení v hostitelské zemi by mělo být dodrženo, s ohledem na epidemiologickou situaci. Žádoucí je vakcinace rizikových skupin, včetně těhotných, před a během chřipkové sezóny.
Tuberkulóza	Nabídnout BCG v souladu s doporučeními hostitelské země. Revakcinace BCG není doporučována.	BCG není obecně u dospělých doporučována, s ohledem na epidemiologickou situaci

* MMR a vakcína proti planým neštovicím jsou kontraindikovány u imunokompromitovaných osob a během těhotenství. K těhotenství by nemělo dojít v průběhu jednoho měsíce po vakcinaci MMR.

** Testy na infekci virovou hepatitidou B (HBsAg) by měly být provedeny před aplikací vakcíny, v souladu s doporučeními v hostitelské zemi.

Disease	Children and adolescents (<18 years)	Adults (> 18 years)
Meningococcal disease	Apply guidelines of the host country for meningococcal vaccines against serogroups A, B, C, W135 and Y, taking into account the epidemiological situation.	
Pneumococcal disease	Offer to individuals ≥ 2 months with 1–3 doses of conjugate vaccine at least one month apart, according to the guidelines in the host country.	Offer to individuals ≥ 65 years, according to guidelines of host country.
Varicella*	Guidelines of the host country should be followed, unless the epidemiological situation suggests otherwise. If used, offer two doses of varicella to individuals ≥ 11 months of age, at least one month apart, but preferably longer.	Guidelines of host country should be followed, taking into account the epidemiological situation. Consider vaccinating non-immune non-pregnant women of childbearing age.
Influenza	Guidelines of host country should be followed, unless the epidemiological situation suggests otherwise. Consider vaccinating risk groups aged over six months ahead of and during the influenza season.	Guidelines of the host country should be followed, taking into account the epidemiological situation. Consider vaccinating risk groups, including pregnant women, ahead of and during influenza season.
Tuberculosis	Offer BCG according to the guidelines of the host country. Re-vaccination with BCG is not recommended.	BCG is generally not recommended for adults, depending on the epidemiological situation.

* *MMR and varicella vaccines are contra-indicated in immunocompromised individuals and during pregnancy. Pregnancy should be avoided for one month after MMR vaccination.*

** *Tests for hepatitis B virus infection (HBsAg) could be carried out before the vaccine is administered, depending on the guidelines in the host country.*