

Případy onemocnění virem Nipah hlášené v Západním Bengálsku v Indii: velmi nízké riziko pro Evropany

ECDC leden 2026

Dva potvrzené případy onemocnění virem Nipah byly hlášeny v Západním Bengálsku v Indii. Na základě aktuálních informací je riziko infekce pro osoby z Evropy, které cestují do této oblasti nebo v ní pobývají, vyhodnoceno jako velmi nízké.

Podle informací oznámených dne 26. ledna 2026 indickými orgány jsou oba případy zdravotnickými pracovníky ve stejné nemocnici a na konci prosince 2025 spolu byli v kontaktu při plnění povinností. Omezený počet případů a jejich zjevná souvislost s jediným zdravotnickým zařízením naznačují, že v této fázi nedochází k žádnému komunitnímu přenosu.

Nejpravděpodobnější cestou k zavlečení viru Nipah do Evropy by byli infikovaní cestující. I když nelze vyloučit import viru, považuje se za nepravděpodobný. Vzhledem k tomu, že kaloni (fruit bats) přenášející virus Nipah se v Evropě nevyskytují, je riziko dalšího přenosu po potenciálním dovozu v současné situaci rovněž hodnoceno jako velmi nízké.

Probíhající vyšetřování a reakční opatření: Indické orgány zavedly preventivní a kontrolní opatření a probíhají vyšetřování s cílem určit možný zdroj infekce. Bylo identifikováno a testováno celkem 196 kontaktů potvrzených případů. Všechny vysledované kontakty zůstávají asymptomatické a byly negativně testovány na infekci virem Nipah. Několik zemí v regionu, včetně Thajska, Nepálu a Kambodže, zahájilo preventivní opatření. Patří mezi ně veřejné informační kampaně a detekční kontroly cestujících přilétajících z Indie na letištích.

Poradenství pro cestovatele

Obecně se doporučuje, aby se lidé žijící v zemích EU/EHP, kteří cestují do Západního Bengálska nebo v něm pobývají, vyhýbali potenciálním zdrojům infekce. To zahrnuje zamezení kontaktu s domácími nebo volně žijícími zvířaty a jejich tekutinami nebo odpadem, nepožívat potraviny, které mohou být kontaminovány netopýry, a nepít syrovou šťávu z palmy datlové (šťáva). Mytí, loupání a vaření ovoce a zeleniny před konzumací se obecně doporučuje, aby se snížilo riziko expozice.

O onemocnění virem Nipah

Nipah virus je zoonotický virus, může se šířit ze zvířat na člověka. Virus přenášejí kaloni, také známí jako létající lišky rodu Pteropus. Tito netopýři se nacházejí v částech jižní a jihovýchodní Asie, oblasti Indického oceánu a Oceánie. Virus může infikovat člověka přímo ze zvířat, z kontaminovaných potravin a prostřednictvím kontaktu člověka s člověkem. Ačkoli ohniska byla dosud hlášena pouze v Asii, virus má epidemický a pandemický potenciál, protože se může šířit mezi lidmi a prostřednictvím domestikovaných zvířat.

Onemocnění virem Nipah je závažné onemocnění, přičemž hlášená míra úmrtnosti se obvykle pohybuje mezi 40 % a 75 % v závislosti na faktorech, jako je kmen viru a přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči. Virus může způsobit zánět mozku (encefalitidu). Z těch, kteří přežijí encefalitidu, přibližně jeden z pěti trpí dlouhodobými neurologickými komplikacemi, včetně opakujících se záchvatů, extrémní únavy nebo změn chování. Ve vzácných případech může dojít k relapsu nebo opožděnému nástupu encefalitidy týdny, měsíce nebo dokonce roky po zotavení a může být fatální. Pro infekci virem Nipah u lidí není k dispozici ani preventivní vakcína, ani specifická antivirová léčba.

Zdroj: <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/nipah-virus-disease-cases-reported-west-bengal-india-very-low-risk-europeans>

Nipah virus disease cases reported in West Bengal, India: very low risk for Europeans