

Virová hepatitida A (dg. B15, VHA), od 1. 1. do 31. 7. 2026, zdroj: ISIN

Celkem bylo v České republice od začátku roku do konce července 2026 hlášeno **1413 případů VHA**.

VHA podle krajů

Onemocnění VHA se vyskytovalo ve všech krajích i v červenci 2026, s výjimkou Karlovarského, Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina, kde nebyl v červenci hlášen žádný případ VHA. Nejvíce případů v červenci 2026 hlásil Ústecký kraj (31x) a Jihomoravský kraj (29x). Nejvíce případů od začátku ledna 2026 hlásí Jihomoravský kraj (451x) a hlavní město Praha (313x), viz tabulka č. 1., graf č. 1.

VHA podle věkových skupin a pohlaví


Nejvíce případů VHA do konce července 2026 bylo hlášeno u dospělé populace nad 25 let věku s maximem výskytu ve věkové skupině 34-44 let (318x). Onemocnění VHA se však stále nevyhýbá ani dětské populaci, u dětí ve věku 0-4 let bylo od začátku roku hlášeno 90 případů onemocnění, ve věkové skupině 5-9 let bylo evidováno 95 případů VHA, viz graf č. 2.

Ve sledovaném období onemocnělo VHA celkem 867 mužů a 546 žen.


Tabulka č. 1: Počet hlášených případů VHA podle jednotlivých krajů a měsíců v roce 2026 (od 1. ledna do 31. července 2026)

Kraj	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	Celkem
PHA	89	70	67	38	19	18	12	313
STČ	25	26	19	22	3	3	11	109
JHČ	25	11	11	8	1	3	1	60
PLK	11	12	9	9	6	3	6	56
KVK	16	6	3	2	2	2	0	31
ULK	22	21	23	19	12	16	31	144
LBK	9	2	2	1	1	2	3	20
HKK	2	0	0	0	0	1	0	3
PAK	5	1	2	2	0	0	1	11
VYS	3	2	14	1	1	1	0	22
JHM	115	87	73	60	33	54	29	451
OLK	2	3	2	2	16	3	2	30
ZLK	9	3	7	2	8	10	4	43
MSK	34	31	25	13	3	5	9	120
Celkem	367	275	257	179	105	121	109	1413

Graf č. 1: Počet hlášených případů VHA v jednotlivých krajích ČR, 1. 1. - 31. 7. 2026



Graf č. 2: Hlášené počty případů VHA podle věkových skupin, 1. 1. - 31. 7. 2026



VHA, úmrtí

Od poslední zprávy VHA ke konci června bylo zaznamenáno jedno úmrtí, v roce 2026 bylo tedy v souvislosti s onemocněním VHA evidováno celkem 7 úmrtí.

Přehled úmrtí na VHA od 1. 1. 2026 do 31. 7. 2026, Česká republika:

1. Muž, 41 let, Ostrava-město (MSK), datum úmrtí 8. 1. 2026, dg. úmrtí B15.0, jaterní cirhóza, bezdomovec,
2. Muž, 59 let, Brno-město (JHMK), datum úmrtí 11. 2. 2026, dg. úmrtí K72, jaterní cirhóza, alkoholik,
3. Muž, 82 let, Praha 2 (PHA), datum úmrtí 10. 3. 2026, dg. úmrtí A41.0, sepse při uroinfektu, polymorbidní pacient,
4. Muž, 57 let, Vsetín (ZLK), datum úmrtí 24. 3. 2026, dg. úmrtí K72.9, alkoholik,
5. Muž, 52 let, Praha 8 (PHA), datum úmrtí 29. 3. 2026, dg. úmrtí K72.0, akutní selhání jater, alkoholik, bezdomovec,
6. Muž, 81 let, Brno-město (JHMK), datum úmrtí 1. 4. 2026, dg. úmrtí K72, selhání jater.
7. Muž, 68 let, Brno – venkov (JHMK), datum úmrtí 7. 7. 2026, dg. úmrtí B15, multiorgánové selhání.

Závěr


Pokles měsíčních počtů hlášených případů VHA je zaznamenán od začátku února 2026 a pokračuje i v dalších měsících, viz graf č. 3, ale riziko vzniku lokálních ohnisek nákazy nadále přetrvává vzhledem k existenci vnímavé části populace. Šíření VHA probíhá v celé populaci, kdy k přenosu nákazy dochází hlavně v důsledku špatných hygienických podmínek a nedodržování cílených protiepidemických opatření. Mezi klíčová preventivní opatření nadále patří očkování proti VHA, důsledné dodržování základních hygienických návyků, zejména pravidelného mytí rukou, konzumace bezpečné pitné vody a hygienicky nezávadných potravin.

Prevence žloutenky A spočívá zejména v očkování. Vzhledem k tomu, že Česká republika patřila v posledních desetiletích mezi země s relativně nízkým výskytem VHA, je velká část české populace k onemocnění vnímavá. Ke zlepšení situace přispívá také lepší dostupnost očkovacích látek a ochota k očkování. Ideální ochranou před onemocněním je preventivní očkování; u kontaktů osob s prokázaným onemocněním hepatitidou A je důležité očkovat co nejdříve v rámci postexpoziční profylaxe; **podle dopisu hlavní hygieničky se proto upouští od vyšetřování protilátek před očkováním kontaktů.**

<https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/h/virove-hepatitidy-infekcni/hepatitida-a/vha-situace-v-cr/dopis-hlavni-hygienicky-dr-mackove-k-uprave-vysetrovani-protilatek-proti-vha-pred-ockovanim-kontaktu/>.

V České republice jsou registrovány bezpečné a účinné očkovací látky (vakcíny) pro děti i dospělé. Základní ochrany je dosaženo po jedné injekčně podané dávce. K získání dlouhodobé ochrany proti infekcím způsobeným virem hepatitidy A je nutné přeočkování druhou dávkou, které se provádí za 6–18 měsíců po podání první dávky.

Graf č. 3: Hlášené počty případů VHA podle měsíců, 1. 12. 2025 - 31. 7. 2026



Zpracoval: Odd. epidemiologie infekčních nemocí SZÚ, Odd. biostatistiky SZÚ